

# Vergiftiging: Vroeë en Buite-hospitaal behandelingstabel

Hou hierdie tabel byderhand sodat u weet wat om te doen in die geval van vergiftiging.

Kontak die gifinligtingshulplyn en volg die behandelingsriglyne vir die verskillende onderstaande kategorieë.

## In die volgende blootstellings :

Moenie braking aanbring nie. Moenie enigiets gee om te drink of te eet nie.

Asetoon  
Battery (Knopie)  
Bensien  
Kanferolie  
Koolstofftetrachloried  
Ontsmettingsmiddels  
Vuuraanstekers  
Insekododers  
Insek-afweermiddels  
Smeermiddels (wintergroen)  
Metaalreinigers/-poleermiddels  
Naellakverwyderaars  
Paraffien  
Verf (olie)  
Verfverwyderaars (oplosbaar)  
Onkruiddoders  
Petrol  
Slakgif  
Verdunners  
Terpentyn (mineraal)  
Vernis

## In die volgende blootstellings:

Moenie braking aanbring nie. Kan klein hoeveelhede water gee. Moenie probeer om die gif te neutraliseer nie.

Ammoniak  
Suur  
Batterysuur  
Bleikmiddel  
Bytsoda  
Sement  
Chloor (vir swembad)  
Kaliumpermanganaat  
Wasmiddels  
Opwasmiddel (vloeibaar)  
Opwasmiddel (poeier)  
Dreinskoonmakers  
Kleursel (tekstiel of hare)  
Materiaalversagter  
Kunsmis  
Haarkleurmiddels  
Haargolfmiddels  
Haarversteilers  
Soutsuur  
Waterstofperoksied  
Motballe (Naftaleen)  
Oondreinigers  
Verfverwyderaar (bytmiddel)  
Kaliumpermanganaat  
Toiletreinigers  
Waspoeier  
Wassoda  
Onkruiddoders  
Glasreinigers

## In die volgende blootstellings:

Moenie braking aanbring nie. Klein hoeveelhede water (halwe koppie) kan gegee word.

Alkohol  
Kalmynmelk (*calamine*)  
Skoonheidsmiddels  
Reukweerders (*deodorant*)  
Fluoriedtablette (gee melk)  
Gom (kontak en ander)  
Mercurochrome  
Brandspiritus  
Parfuum  
Plante  
Rottegif (bv. Rattex)  
Sjampoe  
Ontsmettingsalkohol

## In die volgende blootstellings:

Hoewel die aanbring van braking gewoonlik nie roetineprocedure is nie, oorweeg dit in pasiënte wat nog heeltemal wakker en helder is binne 'n uur na groot innames gedoen is. Gee 'n glas louwarm water, gevvolg deur stimulasie van die keel deur 'n vinger of lepel se platkant versigtig in te steek. Moenie voortgaan hiermee as dit nie dadelik effektief is nie.

Aspirien  
Ystertablette  
Sampioene—giftig  
Parasetamol  
Pille  
Tablette  
Ysterbevattende vitamiene

Slangbyt, spinnekopbyt of skerpioensteek: Indien moontlik, kontak die gifinligtingshulplyn en **neem die pasiënt so gou moontlik na 'n kliniek/hospitaal**.

**BÈRE ALLE MEDISYNE, HUISHOUDELIKE CHEMIKALIEË EN INSEKDODERS BUISTE DIE BEREIK VAN KINDERS.** Indien 'n gifstof in kontak met die oë kom, moenie dit probeer neutraliseer nie, maar spoel die oë net vir 15–20 minute versigtig met water en neem die persoon na die naaste kliniek/hospitaal. Indien die vel met 'n giftige stof in aanraking kom, was dit met seep en water. **Neem die houer en 'n monster van die medikasie of gif of plant of ander biologiese materiaal saam met die pasiënt na die kliniek of hospitaal.**

# Gifinligtingshulplyn

van die Wes-Kaap, wat Suid-Afrika bedien

**0861 555 777**

Opgestel deur: Tygerberg Gifinligtingsentrum  
[toxicology@sun.ac.za](mailto:toxicology@sun.ac.za) / [www.sun.ac.za/poisoncentre](http://www.sun.ac.za/poisoncentre)